



КАТАЛОГ



ADS

ADS - насіннєвий бренд з ексклюзивною дистрибуцією ранньостиглого зубовидного гібриду Drivia (Дрівія). Цей гібрид кукурудзи вирізняється високим розміщенням качана та раннім цвітінням, що гарантує його гарне виповнення та стабільний врожай.

Чому варто обрати насіння ADS?



Якість

ADS - це якісне насіння кукурудзи з високими стандартами добору. Якісне насіння забезпечує більш рівномірні та швидкі сходи.



Комплексність

Комплексні рішення для вирощування культур, включаючи підбір насіння, готові системи захисту та живлення рослин з використанням якісних продуктів власних торгових марок ТМ Kartal та ТМ Ультрабiон.



Урожайність

Відібрані гібриди з високою врожайністю та стабільністю, що підтверджена українськими фермерами та багаторічними дослідженнями.



Генетика

Гібриди відповідають ґрунтово-кліматичним вимогам по всій території України. Мають підвищену стійкість до екстремальних умов та широкого температурного діапазону.

KARTAL 

ТМ Kartal – лінійка ефективних високоякісних засобів захисту рослин та добрив для всього циклу сільськогосподарського виробництва з моменту обробки насіння до збору врожаю.

ТМ Kartal – це 30 традиційних препаратів, перевірених часом, розроблених та виготовлених за сучасними європейськими розробками.

Поєднання досвіду та сучасних технологій дає препаратам ТМ Kartal наступні переваги:



Ретельно пропрацьована рецептура

При розробці рецептури враховувалися такі фактори, як: біологічна ефективність, фітотоксичність, зручність застосування, ефективність у бакових сумішах та вплив зовнішніх факторів.



Висока якість діючих та допоміжних речовин

Бренд співпрацює з найкращими заводами, які виробляють діючі речовини для ЗЗР всесвітньовідомих мультинаціональних компаній. Вони забезпечують подвійний контроль якості при виробництві.



Оптимальний підбір препаратів у лінійці

Продукти ТМ Kartal дають можливість ефективніше діяти на актуальні проблеми, уникаючи зайвих витрат, та створювати будь-які необхідні захисні комбінації.



Збалансована ціна

Збалансовані ціни дозволяють сільським господарствам отримувати достойну компенсацію за свою працю та витрати на виробництво.

Ми глибоко розуміємо потреби аграріїв й постійно вивчаємо тенденції розвитку у всьому світі, завдяки чому пропонуємо якісні та водночас ефективні продукти, що допомагають виробникам с/г продукції максимально збільшити прибуток з кожного гектару.



Зміст

Насіння

Кукурудза	8
-----------	---

Добрива

Міндобрива	14
------------	----

Засоби захисту рослин

Гербіциди	20
Фунгіциди	39
Інсектициди	47
Протруйники	51
Десиканти	54
Ад'юванти та інше	56


Бакові суміші

Бакові суміші	62
Рекомендації	63

Системи захисту та живлення

Кукурудза	66
Озима пшениця	67
Ріпак	68
Соняшник	69
Соя	70





Насіння




Кукурудза

Гочі	8
Даламер	9
Дрівіа	10



ADS



Гочі

ФАО 360

Середньопізній гібрид, що відзначається високим потенціалом врожайності та потужними, добре виповненими качанами. Він демонструє високу стабільність врожайності за різних умов зволоження та мінерального живлення.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напрямок використання	Зерновий
Група стиглості	Середньопізній
Висота стебла	248,8-265,4 см
Зерен у ряду	30-36
Тип зерна	Зубовидний

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- ☒ Стійкий до вилягання стебла
- ☒ Придатний до пізнього збирання
- ☒ Хороша стійкість до хвороб та шкідників

ОЦІНКА ОЗНАК

Енергія початкового росту

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Виповненість качана при фізіологічній стиглості

6

6

8

8

9

*0-низький показник, 9-високий показник

Потенціал
врожайності, т/га

15,8

Кількість рядів
зерен

16-20

Висота кріплення
качана, см

91-107

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Зона вирощування:



Степ



Лісостеп



Полісся

Рівень мінерального живлення:

Середній і високий

Обробіток ґрунту:

Традиційний та мінімальний

Придатний для вирощування в монокультурі:

Придатний

Температура ґрунту в період сівби:

Від +10 °C на глибині посіву

Густота рослин на період збирання:

Недостатнє зволоження

60-65

Достатнє зволоження

70-75

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Стеблова гниль

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сажка

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Фузаріоз

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Гельмінтоспоров

1 2 3 4 5 6 7 8 9

*0-низький показник, 9-високий показник



Даламер

ФАО 280

Забезпечує гарантовану прибутковість при використанні професійних технологій. Цей гібрид є одним з найбільш продуктивних у своїй групі стиглості.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напрямок використання	Зерновий
Група стиглості	Середньоранній
Висота стебла	210-230 см
Зерен у ряду	28-30
Тип зерна	Зубовидний

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- ✓ Стабільний
- ✓ Придатний до вирощування у різних умовах
- ✓ Ефект stay green

ОЦІНКА ОЗНАК

- Енергія початкового росту
- Холодостійкість
- Вилягання стебла
- Посухостійкість
- Вологовіддача
- Кореневе вилягання (до збирання)
- Виповненість качана при фізіологічній стиглості

*0-низький показник, 9-високий показник

Потенціал врожайності, т/га	Вологовіддача	Висота кріплення качана, см
15,5	Висока	90-105

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Зона вирощування:

- Степ
- Лісостеп
- Полісся

Рівень мінерального живлення:

Середній і високий

Обробіток ґрунту:

Традиційний та мінімальний

Придатний для вирощування в монокультурі:


Придатний

Температура ґрунту в період сівби:

Від +10 °C

Густота рослин на період збирання:

Недостатнє зволоження	50-60
Достатнє зволоження	75-80



Дрівіа

ФАО 260

Високоврожайний ранньостиглий гібрид. Середньорослий, з відносно високим розташуванням качана та раннім цвітінням.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

♂ Напрямок використання	Зерновий
🌾 Група стиглості	Ранньостиглий
📏 Висота стебла	220-250 см
☼ Зерен у ряду	32-39
🌽 Тип зерна	Зубовидний

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- ☒ Стабільний
- ☒ Високий потенціал урожаю
- ☒ Висока вологовіддача

ОЦІНКА ОЗНАК

Енергія початкового росту
Холодостійкість
Посухостійкість
Вологовіддача
Виповненість качана при фізіологічній стиглості

*0-низький показник, 9-високий показник

Потенціал врожайності, т/га	Середня маса 1000 насінин, г	Висота кріплення качана, см
15,5	320-430	120

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

Вилягання	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сажка	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фузаріоз	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Гельмінтоспоров	1	2	3	4	5	6	7	8	9

*0-низький показник, 9-високий показник

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Зона вирощування:



Степ



Лісостеп



Полісся

Рівень мінерального живлення:

Середній і високий

Обробіток ґрунту:

Традиційний та мінімальний

Придатний для вирощування в монокультурі:

Придатний

Температура ґрунту в період сівби:

Від +10 °C

Густота рослин на період збирання:

Недостатнє зволоження

65-70

Достатнє зволоження

75-80

4 НОВИНКИ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН



Хеліан Форте

Піраклостробін 200г/л + боскалід 150 г/л, КС

Фунгіцид подвійної сили! Ідеальне поєднання піраклостробіну та боскаліду гарантує потужний захист і лікування ваших культур — максимум урожаю без компромісів.



Атаракс

Тебуконазол 240 г/л + епоксиконазол 60 г/л +
пропіконазол 60 г/л, КЕ

Три діючі речовини — максимальний захист! Потужний системний фунгіцид із тривалою дією для здоров'я вашого врожаю.



Авіседа

Мезотріон, 75 г/л + нікосульфурон, 30 г/л, МД

Максимальна кількість олій у складі — для кращого прилипання та проникнення діючих речовин. Надійний контроль бур'янів і падалиці соняшнику у посівах кукурудзи.



Циркус

клетодим, 360 г/л

Максимум дії — мінімум зусиль!
Інноваційна формула з прилипачем для знищення злакових бур'янів без зайвих обробок



Добрива

Міндобрива

Вегабор	14
Вегацинк	15
Мультикомплекс	16





Sanny Mix Бор

Мікродобриво мінеральне комплексне

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	В - 150 г/л, N + 72,3 г/л, Super Chelate
Преперативна форма	Розчин
Хімічна група	Добриво з мікроелементами
Класифікація ВООЗ	Безпечний
Тара	Каністра 10 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Сприяє інтенсивному проростанню пилку, покращує якість запилення квіток.
- ☒ Позитивно впливає на накопичення цукрів у тканинах озимих культур та коренеплодах цукрових буряків, фруктів.
- ☒ Підвищує активність ферментів, активізує білковий і фосфорний обмін.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Фаза розвитку культури	Норма внесення, л/га
Соняшник	2-4 пари листків/ 6-8 пари листків	1,0 - 2,0
Ріпак	4-6 листків/ бутонізація	
Соя	3-5 трійчастих листків/ бутонізація	
*Зернові	Кущення/ прапорцевий листок	
*Кукурудза	3-5 листків/ 7-8 листків	
*Зернобобові	3-5 трійчастих листків/ бутонізація	
*Картопля	Бутонізація/ після цвітіння	
*Цукрові та кормові буряки	4-6 листків/ змикання листків в міжряддях	
*Виноград	До цвітіння/розм'якшення ягід	
*Плодово-ягідні	До цвітіння/після цвітіння (зав'язь)	
*Овочі та інші культури	Активне зростання (при нестачі бору з інтервалом не менше 2-х тижнів)	

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною



Sanny Mix Цинк

Мікродобриво мінеральне комплексне

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	Zn 130 г/л - N 120 г/л, вільні амінокислоти 40 г/л, Super Chelate
Преперативна форма	Розчин
Хімічна група	Добриво з мікроелементами
Класифікація ВООЗ	Безпечний
Тара	Каністра 10 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Підвищує посухо-, жаро- та морозостійкість рослин. Знижує ураженість рослин грибковими захворюваннями.
- ☒ Стабілізує синтез хлорофілу, білка та вуглеводів у клітинах. Підвищує цукристість плодових та ягідних культур.
- ☒ Прискорює темпи утворення хлорофілу, запобігає руйнуванню хлоропластів.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Строки внесення	Норма внесення, л/га
Кукурудза	3-5 листків/7-8 листків/9-11 листків	0,8-1,5
* Сорго	3-5 листків/7-8 листків/9-11 листків	0,8-1,5
* Зернові	Кущення/вихід у трубку	0,5 – 1,0
* Зернобобові	3-5 трійчастих листків/бутонізація	1,0 – 1,5
* Соняшник	2-4 пари листків/6-8 пари листків	0,5 – 1,0
* Ріпак	4-6 листків/бутонізація	0,5 – 1,0
* Цукрові та кормові буряки	4-6 листків/змикання листків в міжряддях	1,0 – 1,5
* Картопля	Сходи/бутонізація	1,0 – 1,5
* Виноград	До цвітіння/після цвітіння (зав'язь)	2,0 – 3,0
* Плодово-ягідні	До цвітіння/після цвітіння (зав'язь)	1,5 – 2,0
* Овочі та інші культури	Активне зростання/через 2 тижні	0,5 – 1,0

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною



Sunny Mix Універсал

Мікродобриво для усіх сільськогосподарських культур, спрямоване на усунення дефіциту елементів живлення в критичні фази розвитку рослин.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Діюча речовина		N-28,12 г/л, Zn-5,69 г/л, Na-3,62 г/л, Fe-1 г/л, Mn-8,13 г/л, Cu-1,63 г/л, B-3,4 г/л, S-15,45 г/л, Mo-0,2 г/л, Co-0,01 г/л, MgO-8,18 г/л, K ₂ O-13,52 г/л, P ₂ O ₅ -10,19 г/л, Super Chelate
 Преперативна форма	Розчин	
 Хімічна група	Добриво з макро- та мікроелементами	
 Класифікація ВООЗ	Безпечний	
 Тара	Каністра 10 л	

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Містить необхідні макро- та мікроелементи в максимально доступній формі, яку забезпечує система SuperChelate®.
- ☒ Містить природні органічні кислоти, які підвищують стабільність та доступність мікродобрив, стимулюють ріст та розвиток рослин.
- ☒ Містить натуральні амінокислоти, сумісний з мікробіологічними препаратами.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

Культура	Фаза розвитку культури	Норма внесення, л/га
Зернові	Кущіння, вихід в трубку/ Прапорцевий лист/ Колосіння	0,5/1,0/1,0
Зернобобові	Обробка насіння/ 2-5 трійчастих листка/ Початок бутонізації	0,25/0,5/1,0
Цукрові буряки	2-3 пари листків/ Перед змиканням міжрядь	0,5/1,0
Соняшник	4-7 листків культури/ Початок зав'язування корзинки	0,5/1,0
Кукурудза	3-5 листків/ 7-10 листків	0,5/0,5


ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Обробку проводять методом додавання до робочого розчину для протруєння (замочування) посівного матеріалу та методом обприскування рослин по вегетації. Перед застосуванням каністру збовтати. Відкриту упаковку зберігати не більше 1 доби.

ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ

Загальним симптомом нестачі будь-якого з елементів живлення є затримка росту рослин, а результатом – зниження врожайності та якості продукції. Sunny Mix Універсал містить максимально повний набір макро- та мікроелементів в оптимальній кількості та дозволяє зберегти біологічний потенціал врожайності рослин.

ВСЯ КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ТА НОВИНИ зібрана на наших інформаційних платформах:



WEB-сайт
kartal.com.ua

Новини

Повний каталог
продукції та послуг

Відповіді на поширені
запитання


Експертні поради

Скануй QR та
дізнайся більше



kartal.com.ua

Онлайн магазин **KARTAL**
- завжди під рукою.



Ми в соціальних мережах:



Facebook
Kartal



Instagram
Kartal



Telegram
Kartal



Viber
Kartal



Засоби захисту рослин

Гербіциди

Авіседа	20
мезотріон, 75 г/л + нікосульфурон, 30 г/л, МД	
Батагур АХ	21
нікосульфурон, 40 г/л, КС	
Вердан	22
клопіралід 300 г/л, РК	
Вультур	23
бентазон, 480 г/л, РК	
Калхат	24
кломазон, 480 г/л, КЕ	
Корвус	25
пропізохлор, 720 г/л, КЕ	
Метрибузин-Стар	26
метрибузин, 600 г/л, КС	
Неофрон	27
2-етилгексиловий ефір 2,4-Д, 452,42 г/л + флорасулам, 6,25 г/л, СЕ	
Раугара АХ	28
ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, РК	
Раугара Екстра	29
калійна сіль гліфосату, 670 г/л, РК	
Сегмент АХ	30
тифенсульфурон-метил, 750 г/кг	
Сутон	31
S-метолахлор, 468 г/л + тербутилазин, 281 г/л, СЕ	
Стурнус	32
прометрин, 500 г/л, КС	
Трінга	33
трибенурон-метил, 750 г/кг, ВГ	
Фалко	34
хізалофоп-п-етил, 125 г/л, КЕ	
Флорті Дуо	35
трибенурон-метил, 563 г/кг + флорасулам, 187 г/кг6 ВГ	
Ханос АХ	36
ацетохлор, 900 г/л, КЕ	
Циркус	37
клетодим, 360 г/л, КЕ	
Церіс	38
етаметсульфурон-метил, 750 г/кг, ВГ	

Фунгіциди

Атаракс	39
тебуконазол 240 г/л + епоксиконазол 60 г/л + пропіконазол 60 г/л, КЕ	
Галеріда	40
карбендазим, 500 г/л, КС	
Петрітс	41
флутріафол, 250 г/л, КС	
Пропізол Форте	42
пропіконазол, 250 г/л, КЕ	

Сункар	43
ципроконазол, 80 г/л + азоксистробін, 200 г/л, КС	
Турнікс	44
тебуконазол, 250 г/л, ЕВ	
Турнікс Екстра	45
тебуконазол, 430 г/л, КС	
Хеліан Форте	46
піраклостробін 200г/л + боскалід 150 г/л, КС	

Інсектициди

Бурунг	47
хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л, КЕ	
Корагупс	48
тіаметоксам, 200 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л, КС	
Ларус	49
альфа-циперметрин, 100 г/л, КЕ	
Пандіон	50
лямбда-цигалотрин, 100 г/л + імідаклоприд, 300 г/л, КС	

Протруйники

Вайрос Старт	51
флудіоксоніл, 25 г/л + металаксил - М 10 г/л, КТ	
Грус	52
тіаметоксам, 350 г/л, ТН	
Тетрао	53
імідаклоприд, 600 г/л, ТКС	

Десиканти

Мілвус	54
дикват, 150 г/л, РК	
Мілвус Екстра	55
дикват дибромід, 374 г/л, РК	

Ад'юванти та інше

Аквакор	56
Суміш органічних кислот, хелатуючі агенти	
Віраго	57
Полідиметилсилоксан	
Каліго	58
Етоксилат ізодецилового спирту, 100%	
Стрікс	59
органосиліконовий сурфактант, РК	





Авіседа

Післясходовий гербіцид з широким вікном застосування для захисту від широкого спектра бур'янів і падалиці соняшнику всіх видів у посівах кукурудзи

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Діюча речовина	Мезотріон 75 г/л + Нікосульфурон 30 г/л
 Преперативна форма	Масляна дисперсія
 Хімічна група	Сульфонілсечовини, Трикетони
 Класифікація ВООЗ	II-й клас небезпечності
 Тара	Каністра 20 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ За одне внесення препарату досягається чистота посіву від усієї сегетальної рослинності.
- ☒ Контролює найпроблемніші бур'яни: пирій повзучий, гумай, осот (види), латук татарський, ваточник сирійський.
- ☒ Завдяки ґрунтовій дії забезпечує контроль наступних хвиль дводольних бур'янів.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробок
Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	1,25 – 2,0	Обприскування під час вегетації у фазі від 2 до 8 листків культури включно	1

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Не використовувати при температурах нижче +12 °C і вище +25 °C; Найкращі результати отримують при обприскуванні бур'янів на ранніх стадіях розвитку, у період, коли вони активно ростуть. Обприскування проводити в ранковий або вечірній час при безвітряній погоді. Максимальну норму внесення слід застосовувати в разі масової появи багаторічних і перерослих бур'янів.

СУМІСНІСТЬ

Не рекомендується додавання інших гербіцидів, мікро- та макроудобрив, ад'ювантів. Можливе внесення з інсектицидами (крім фосфорорганічних). Перед приготуванням бакової суміші слід провести тест на сумісність.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

На наступний рік після застосування препарату не рекомендується вирощувати цукрові буряки, горох та овочі. Сою, соняшник та ріпак рекомендовано висівати після оранки. Кукурудзу, сорго, пшеницю, ячмінь – без обмежень.



Батагур АХ

Системний післясходовий гербіцид для знищення злакових бур'янів у посівах кукурудзи

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	Нікосульфурон, 40 г/л
Преперативна форма	Концентрат суспензії
Хімічна група	Похідні сульфонілсечовини
Класифікація ВООЗ	III-й клас небезпечності
Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Знищує всі злакові бур'яни разом з кореневою системою, включаючи багаторічні, у тому числі пирій повзучий і гумай.
- ☒ Застосовується в широкому діапазоні фаз розвитку кукурудзи – від 3 до 10 листків.
- ☒ Не має післядії на наступні культури у сівозміні.
- ☒ Високоєфективний навіть в умовах посухи.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробок
Кукурудза	Багаторічні злакові (пирій, гумай)	1,25	Бур'ян висотою 15-25 см	1
	Однорічні злакові	1,0	1-3 листка у бур'янів	
	Деякі однорічні дводольні	1,25	2-4 справжніх листка у бур'янів	

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Обробку гербіцидом необхідно проводити в період інтенсивного росту бур'янів. Ідеальними умовами для обробки є температура від +10 °C до +25 °C. Не рекомендується використовувати препарат у холодну або жарку погоду, коли рослини знаходяться у стресовому стані. Для максимальної ефективності роботи препарату відносна вологість повітря має становити не менше 40-50%.

СУМІСНІСТЬ

Застосовується як самостійно, так і в бакових сумішах з гербіцидами.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не рекомендується робити бакові суміші з препаратами групи фосфорорганічних. У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності препарату.



Вердан

Післясходовий гербіцид системної дії для знищення однорічних дводольних та багаторічних коренепаросткових бур'янів, в т.ч. стійких до 2,4-Д у посівах с/г культур.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Діюча речовина	Клопіралід 300 г/л
 Преперативна форма	Розчинний концентрат
 Хімічна група	Похідні піридинкарбонової кислоти
 Класифікація ВООЗ	III-й клас небезпечності
 Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Окрім наземної знищує також кореневу систему бур'янів.
- ☒ Працює проти проблемних бур'янів (осот, ромашка гірчак, нетреба, та ін.)
- ☒ Широкий спектр дії.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробок
Озимий ріпак	Однорічні та багаторічні дводольні у т.ч. коренепаросткові, бур'яни	0,3 - 0,5	Обприскування посівів у фазі 6–8 листків у однорічних бур'янів, у фазі розетки – початку формування генеративного пагону 2–8 см (проти осотів)	1
*Кукурудза		0,5 - 1,0	Обприскування культури від фази 3–5 листків культури	
*Ярий ріпак		0,3 - 0,5	Обприскування у фазі 3–4 справжніх листків культури	
*Озима пшениця			Обприскування від фази кущення до виходу в трубку культури	
*Цукрові буряки			Обприскування посівів у фазі 1–3 пари справжніх листків культури	

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною



Вультур

Ефективний післясходовий селективний контактний гербіцид проти дводольних бур'янів в посівах сої

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	Бентазон, 480 г/л
Преперативна форма	Розчинний концентрат
Хімічна група	Бензотіадіазинони
Класифікація ВООЗ	III-й клас небезпечності
Тара	Каністра 20 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Має високу селективність до культурної рослини. Жодних обмежень у сівозміні.
- ☒ Один гербіцид для захисту багатьох культур.
- ☒ Ефективний контроль падалиці ріпаку та соняшнику, в тому числі Clearfield® та HTS систем.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробок
Соя	Однорічні дводольні в т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х	1,5-3,0	Обприскування посівів в фазі 1-3 трійчастих листків культури	1
*Кукурудза		2,0-4,0	Обприскування посівів в фазі 3-5 листків культури	
*Пшениця, *жито, *ячмінь, *овес			Обприскування посівів весною в фазі кушення культури	
*Горох на зерно		3,0	Обприскування посівів в фазі 5-6 листків культури	
*Льон-довгунець			Обприскування посівів у фазі ялинки	
*Просо		2,0-4,0	Обприскування посівів у фазі 3-х листків культури	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не рекомендується робити бакові суміші з препаратами групи фосфорорганічних.

У разі порушення регламенту застосування можливе зниження ефективності.



Калхат

Досходовий гербіцид для якісного контролю однорічних дводольних та деяких однорічних злакових бур'янів у посівах ріпаку, сої, капусти, баштанних культур і картоплі

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Діюча речовина	Кломазон, 480 г/л
 Преперативна форма	Концентрат, що емульгується
 Хімічна група	Ізоксазолідинони
 Класифікація ВООЗ	III-й клас небезпечності
 Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Гербіцид вибіркової дії, при використанні його в рекомендованих нормах не впливає на розвиток культурних рослин.
- ☒ Зупинка росту та розвитку чутливих рослин відбувається вже через 4-6 годин після застосування препарату. Довготривалість захисного екрану.
- ☒ Прекрасний партнер для бакових сумішей. Рішення в боротьбі з підмаренником чіпким та лободою білою.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробок
Ріпак	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	1,15 – 2,0	Обприскування ґрунту до сходів культури.	1
*Соя				

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Максимальний ефект досягається за якісного передпосівного обробітку ґрунту та наявності вологи. Обприскування ґрунту проводиться протягом перших трьох днів після висіву, а найкраще – відразу після висівання.

За потреби пересівання, через 30-60 днів після обробки, ріпак та сою можна сіяти після поверхневої обробки ґрунту на глибину 8-10 см. На наступний рік для всіх інших культур рекомендується провести глибоку оранку.



Корвус

Ґрунтовий гербіцид для контролю однорічних дводольних та злакових бур'янів

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	Пропізохлор, 720 г/л
Преперативна форма	Концентрат емульсії
Хімічна група	Хлорацетаміди
Класифікація ВООЗ	III-й клас небезпечності
Тара	Каністра 20 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Корвус нефітотоксичний на культури при дотриманні регламенту застосування.
- ☒ Проникаючи через кореневу систему, пропізохлор спричиняє швидку загибель бур'янів.
- ☒ Гербіцид забезпечує тривалу захисну дію.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробок
Соняшник	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	2,0 – 3,0	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури	1
*Горох			Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури	
*Цукрові буряки			Обприскування посівів у фазі до 3-4 листків у культури	
*Кукурудза			Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури	
*Ріпак			Обприскування посівів у фазі до 2-4 листків у культури	
			Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури	



Метрибузин-Стар

Високоєфективний гербіцид проти однорічних широколистих та злакових бур'янів

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	Метрибузин, 600 г/л
Преперативна форма	Концентрат суспензії
Хімічна група	Триазини
Класифікація ВООЗ	III-й клас небезпечності
Тара	Каністра 20 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Відмінно контролює однорічні дводольні та злакові бур'яни.
- ☒ Тривалий період захисної дії.
- ☒ Швидша розчинність у воді. Немає піноутворення.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробок
Соя	Однорічні дводольні бур'яни, однорічні злакові бур'яни	0,5 – 0,7	Обприскування ґрунту до появи сходів культури.	1
*Картопля		0,5 - 1,1	Обприскування ґрунту до появи сходів культури.	
*Томати безрозсадні		0,3 - 0,5	Обприскування культури у фазі 2-3 листків культури	
*Томати розсадні		0,5 - 0,7	Обприскування до висаджування розсади в ґрунт або через 15-20 днів після висаджування розсади у ґрунт	
*Морква	Однорічні дводольні бур'яни, однорічні однодольні бур'яни	0,3 - 0,5	Обприскування у фазу "олівця" культури	
*Яблуна		1,0	Обприскування ґрунту весною до сходів, або на початку появи сходів бур'янів (за висоти рослин до 5 см)	



Неофрон

Післясходовий гербіцид для захисту від широкого спектру однорічних та багаторічних дводольних бур'янів

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Діюча речовина	2-етилгексиловий ефір 2,4-Д, 452, 42 г/л + флорасулам, 6,25 г/л
 Преперативна форма	Суспензійна емульсія
 Хімічна група	Похідні арілоксиалканкарбонової кислоти + триазолпіримідини
 Класифікація ВООЗ	III-й клас небезпечності
 Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Висока швидкість дії на бур'яни. Здатен контролювати широкий спектр дводольних бур'янів.
- ☒ Сумісний з більшістю агрохімікатів, які застосовуються у посівах зернових культур та кукурудзи.
- ☒ Досить широке технологічне вікно застосування.
- ☒ Відсутність післядії препарату на наступні культури в сівозміні.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробок
Кукурудза	Однорічні дводольні бур'яни, в т. ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА, та деякі багаторічні дводольні бур'яни.	0,4 - 0,6	Фаза формування 3-7 листків у рослин культури та 2-4 листки у бур'янів	1
*Пшениця озима і яра, *ячмінь озимий і ярий, *жито, *овес			Під час вегетації від початку фази кушення до другого міжвузля культури	
*Просо			Під час вегетації від початку фази кушення до виходу в трубку культури	
*Сорго			Під час вегетації у фазах від 3 до 5 листків у культурі	

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною



Раугара АХ

Неселективний системний гербіцид широкого спектру дії

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л, у кислотному еквіваленті-360 г/л
Преперативна форма	Розчинний концентрат
Хімічна група	Похідні гліцину
Класифікація ВООЗ	III-й клас небезпечності
Тара	Каністра 20 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Знищує надземну частину та кореневу с-му бур'янів завдяки системній дії, що актуально у боротьбі з багаторічними бур'янами.
- ☒ Знижує забур'яненість полів і зводить до мінімуму кількість агротехнічних заходів направлених на боротьбу з бур'янами.
- ☒ Завдяки застосуванню високоякісних, інноваційних поверхнево активних речовин Раугара АХ має кращу проникність.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробок
Поля призначені під посів озимої пшениці	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0 - 5,0	Проти вегетуючих бур'янів за 2 тижні до сівби	1
Землі несільськогосподарського користування		3,0 - 6,0	Вегетуючі бур'яни	
*Поля призначені під посів ярих зернових, овочевих культур, соняшнику та картоплі	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	2,0 - 4,0	Вегетуючі бур'яни восени, після збирання попередника	
	Багаторічні злакові та дводольні бур'яни	4,0 - 6,0		
*Зернові, *кукурудза	Десикація культури та знищення бур'янів	3,0 - 4,0	Посіви за 2 тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30%	

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною



Раугара Екстра

Системний гербіцид суцільної дії.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	Калійна сіль гліфосату 670 г/л (у кислотному еквіваленті – 545 г/л)
Преперативна форма	Розчинний концентрат
Хімічна група	Похідні гліцину
Класифікація ВООЗ	III-й клас небезпечності
Тара	Каністра 20 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Найвища розчинність серед гліфосатів. Надзвичайно швидка дія.
- ☒ Зменшена норма витрати. Ефективно знищує як однорічні, так і багаторічні бур'яни.
- ☒ Істотно знижує загальну забур'яненість полів і зводить до мінімуму кількість агротехнічних заходів направлених на боротьбу з бур'янами.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати, л/га	Період застосування препарату	Кр-ність обробок
Поля, призначені під посіви соняшнику, ріпаку, люцерни, багаторічних трав	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	2,0 - 4,0	Обприскування вегетуючих бур'янів навесні	1
*Плодові та виноградники	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	2,0	Обприскування вегетуючих бур'янів весною або влітку	2
	Багаторічні злакові та дводольні бур'яни	4,0		
*Поля, призначені під посіви, кукурудзи, картоплі, сої, соняшнику, ріпаку, люцерни, льону, овочевих та баштанних культур	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	2,0 - 4,0	Обприскування вегетуючих бур'янів навесні, за 2 тижні до висівання культури	1
*Пари	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	2,0 - 4,0	Обприскування бур'янів у період їх активного росту	2
*Землі несільськогосподарського призначення (смуги відчуження леп, газо- і нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи, аеродроми)	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	2,0 - 4,0	Обприскування бур'янів у період їх активного росту	3



Сегмент АХ

Системний гербіцид для контролю широколистяних бур'янів у посівах сої, кукурудзи, льону, та зернових колосових культур.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Діюча речовина	Тифенсульфурон-метил, 750 г/кг
 Преперативна форма	Водорозчинні гранули
 Хімічна група	Сульфонілсечовини
 Класифікація ВООЗ	III-й клас небезпечності
 Тара	Банка 0,5 кг

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Економний контроль основних дводольних бур'янів.
- ☒ Відсутність будь-яких обмежень у сівозміні.
- ☒ Висока селективність.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

Культура	Цільовий об'єкт обробки	Норма витрати препарату, г/га	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробок
Пшениця озима	Чутливі однорічні дводольні бур'яни	15-20 г/га + ПАР ад'ювант Стрікс 0,5-0,6 л/100 л води	Від 2-3 листків до початку трубкування	1
*Соя		6-8 г/га + ПАР ад'ювант Стрікс 0,5-0,6 л/100 л води	Від фази 1-2 справжніх листки – до початку бутонізації	1
*Пшениця яра, *ячмінь ярий		10-15 г/га + ПАР ад'ювант Стрікс 0,5-0,6 л/100 л води	Від 2-3 листків до початку трубкування	1
*Кукурудза		10 г/га + ПАР ад'ювант Стрікс 0,5-0,6 л/100 л води	3-5 листків кукурудзи	1
*Льон		15-25 г/га	У фазі ялинки	1



Сутон

Двокомпонентний селективний гербіцид ґрунтової та листової дії для комплексного контролю широкого спектру бур'янів.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	S-метолахлор, 468 г/л + тербутилазин, 281 г/л
Преперативна форма	Суспо-емульсія
Хімічна група	Хлорацетаміди, триазини
Класифікація ВООЗ	III-й клас небезпечності
Тара	Каністра 20 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Тривалий захисний період (6-8 тижнів).
- ☒ Відсутність фітотоксичності на соняшник і сою.
- ☒ Відсутність післядії та резистентності. Можливість використання на селекційних ділянках.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробок
Соняшник	Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни	2,7 - 3,0	Обприскування ґрунту до сівби, під час сівби, після сівби, але до появи сходів культури	1
*Соя			До появи сходів, після посіву, або по сходях у фазах 3-5 листків у культури	
*Кукурудза			До появи сходів	
*Картопля			До появи сходів	

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Поверхня поля має бути рівною, ґрунт повинен мати структуру з дрібними грудочками, а також запаси доступної ґрунтової вологи. Обприскування проводиться при швидкості вітру не більше ніж 4 м/с, за температури повітря від +10°C до +25°C. У разі пересіву оброблених площ не можна сіяти зернові, ріпак, гірчицю, цукрові буряки. Восени можна сіяти зернові, ріпак, гірчицю.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

При надмірному випаданні вологи у період дії гербіциду (підтопленні) молоді сході рослин (соє, соняшник) можуть потрапити під дію препарату. У разі пересіву оброблених площ не можна сіяти зернові, ріпак, гірчицю, цукрові буряки. Восени можна сіяти зернові, ріпак, гірчицю.



Стурнус

Селективний ґрунтовий гербіцид широкого спектру дії

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	Прометрин, 500 г/л
Преперативна форма	Концентрат суспензії
Хімічна група	Похідні триазину
Класифікація ВООЗ	II-й клас небезпечності
Тара	Каністра 20 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Ефективно контролює широкий спектр однорічних дводольних та деяких злакових бур'янів.
- ☒ Тривалий період захисної дії – 6 – 10 тижнів (залежно від погодних умов).
- ☒ Не фітотоксичний для культури (при дотриманні регламенту застосування)

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробок
Соняшник	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	2,0 - 4,0	До посіву, одночасно з висіванням або до появи сходів культури	1
Картопля		3,0 - 4,0		
Морква		1,5 - 3,0	До посіву, до появи сходів або у фазі 2-х справжніх листків культури.	
*Горох		3,0 - 4,0	До посіву, одночасно з висіванням або до появи сходів культури	
*Соя		2,0 - 3,0		

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Препарат застосовують шляхом обприскування ґрунту: до посіву, під час посіву або відразу після посіву за допомогою наземних обприскувачів. Поверхня поля має бути вирівняна, ґрунт повинен мати дрібно-грудкувату структуру, а також запаси доступної ґрунтової вологи.

Гербіцид забезпечує захист культурних рослин до 10 тижнів, в залежності від ґрунтово-кліматичних умов та норми витрати препарату.




Трінга

Післясходовий селективний гербіцид

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	Трибенурон-метил, 750 г/кг
Преперативна форма	Водорозчинні гранули
Хімічна група	Сульфонілсечовини
Класифікація ВООЗ	III-й клас небезпечності
Тара	Банка 0,5 кг

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Можливе застосування - від появи 2-х листків до прапорцевого листка культури.
- ☒ Ефективний від +5°C до +25°C.
- ☒ Сумісний з більшістю пестицидів, що дає змогу застосовувати у бакових сумішах.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, г/га	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробок
Озима пшениця	Однорічні та багаторічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д бур'яни	15-25 + ПАР ад'ювант Стрікс 50-60 мл/100 л води	Посіви в фазі від 2-3-х листків до появи прапорцевого листка включно	1
*Соняшник (технологія Express)	Однорічні та багаторічні злакові бур'яни	0,03 - 0,05 + ПАР Тренд 90 0,25 - 0,3 л/га	2-8 листя культури. Перші фази розвитку бур'янів.	1
*Соняшник (технологія Express)	Однорічні та багаторічні злакові бур'яни	0,03 - 0,05 + ПАР Тренд 90 0,25 - 0,3 л/га	2-8 листя культури. Перші фази розвитку бур'янів.	2
*Ячмінь, *яра пшениця	Однорічні та багаторічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д бур'яни	15-20 + ПАР ад'ювант Стрікс 50-60 мл/100 л води	Посіви в фазі від 2-3-х листків до появи прапорцевого листка включно	1

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною



Фалко

Селективний післясходовий гербіцид системної дії

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	Хізалофоп-п-етил, 125 г/л
Преперативна форма	Концентрат, що емульгується
Хімічна група	Похідні арилоксифеноксипропіонової кислоти
Класифікація ВООЗ	II-й клас небезпечності
Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Ідеально вирішує проблему забур'яненості посівів злаковими бур'янами.
- ☒ Відсутність післядії на наступні культури в сівозміні.
- ☒ Висока ефективність знищення падалиці зернових культур.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробок
Ріпак озимий	Однорічні злакові бур'яни	0,6 - 0,8	Від 2-х справжніх листків до початку бутонізації	1
	Багаторічні злакові бур'яни	0,8 - 1,2		
*Соняшник	Однорічні злакові бур'яни	0,6 - 0,8	2 - 6 листків культури	
	Багаторічні злакові бур'яни	0,8		
*Соя, горох	Однорічні злакові бур'яни	0,6 - 0,8	Від сходів до початку цвітіння культури	
	Багаторічні злакові бур'яни	0,8 - 1,2		
*Картопля	Однорічні злакові бур'яни	0,6 - 0,8	Від сходів до змикання міжрядь культури	
	Багаторічні злакові бур'яни	0,8 - 1,2		
*Цукровий буряк	Однорічні злакові бур'яни	0,6 - 0,8	Незалежно від фази культури	
	Багаторічні злакові бур'яни	1,0 - 1,2		

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною



Флорті Дуо

Двокомпонентний гербіцид для боротьби з широким спектром однорічних та багаторічних дводольних бур'янів, в тому числі стійких до 2,4-Д та МЦПА, в посівах зернових культур

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Діюча речовина	Трибенурон-метил, 563 г/кг + флорасулам, 187 г/кг
 Преперативна форма	Водорозчинна гранула
 Хімічна група	Сульфонілсечовини, триазолпіримідини.
 Класифікація ВООЗ	
 Тара	Банка 0,5 кг

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Дозволяє застосування у широкому діапазоні розвитку культури.
- ☒ Характеризується високою селективністю до вирощуваних культур.
- ☒ Результативно бореться з осотами, лободою білою, диким маком, польовою ромашкою, кульбабою, хрестоцвітими бур'янами

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Найкраща дія препарату досягається при обробці дводольних бур'янів на ранніх стадіях їх розвитку: однорічних у фазах 2 - 4 листків, багаторічних – в фазах розетки до початку стеблування, наявності перерослих видів (підмаренник чіпкий – висота до 15-20 см, види ромашки – висота до 20 см, види осоту – до бутонізації). Оптимальна температура застосування - від 8 до 25 °С, коли проходить активний ріст бур'янів і препарат діє швидше. При виборі строку обприскування краще орієнтуватися на стадію розвитку бур'янів, а не культури. Максимальна норма витрати препарату використовується у випадку високої вихідної забур'яненості, з переважанням багаторічних коренепаросткових бур'янів. При дуже сильній забур'яненості та густому стеблесті культурі слід використовувати максимальний об'єм робочої рідини. Якщо рослини мокрі від роси чи дощу, а також якщо протягом 3 год після обробки очікуються опади, то застосовувати гербіцид не слід. Також не рекомендується проводити обробку в ті дні, коли прогноуються нічні приморозки і після них. Поверхнево-активна речовина покращує змочування бур'янів робочою рідиною та суттєво збільшує гербіцидний ефект препарату.

СУМІСНІСТЬ

Може застосовуватися у бакових сумішах з гербіцидами на основі 2,4-Д (амінна сіль чи ефір) та дикамби. Максимальна ефективність препарату, при самостійному застосуванні, досягається у баковій суміші з ПАР. Гербіцид також можна вносити сумісно чи послідовно з більшістю інсектицидів та фунгіцидів, дозволених для використання на зернових колосових культурах.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не рекомендується застосовувати препарат в суміші з фосфорорганічними інсектицидами, а також чергувати обробки фосфорорганічними інсектицидами та гербіцидом, якщо розрив між ними не перевищує 7 днів, через можливе пригнічення культури.



Ханос АХ

Селективний досходовий гербіцид

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Діюча речовина	Ацетохлор, 900 г/л
 Преперативна форма	Концентрат емульсії
 Хімічна група	Хлорацетаміди
 Класифікація ВООЗ	II-й клас небезпечності
 Тара	Каністра 20 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Високоєфективний контроль більшості поширених однорічних злакових дводольних бур'янів.
- ☒ Захисна дія триває 6-8 тижнів.
- ☒ Розкладається в ґрунті протягом вегетаційного періоду і не має післядії.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробок
Соняшник	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	1,5 - 2,5	До появи сходів культури	1
Кукурудза		1,8 - 3,0		

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

На ефективність препарату впливає якість обробітку ґрунту. Найбільший ефект досягається, коли ґрунт перед внесенням препарату знаходиться у дрібногрудочковатому стані з мінімальними залишками рослинних решток. Препарат вноситься до появи сходів культури.

СУМІСНІСТЬ

Сумісний з іншими ґрунтовими гербіцидами, які дозволені на відповідних культурах. Перед приготуванням робочих сумішей доцільно перевірити їх на сумісність (відсутність осаду, піни, розшарування, неповне розчинення одного з препаратів, підвищення температури тощо).



Церіс

Післясходовий гербіцид системної дії

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	Етаметсульфурон-метил, 750 г/кг
Преперативна форма	Водорозчинні гранули
Хімічна група	Сульфонілсечовини
Класифікація ВООЗ	III-й клас небезпечності
Тара	Банка 0,25 кг

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Контролює основні капустяні бур'яни.
- ☒ Має широке вікно застосування.
- ☒ Безпечний для наступних культур у сівозміні.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, г/га	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробок
Озимий ріпак	Однорічні дводольні бур'яни	20-25 + ПАР ад'ювант Стрікс 50-60 мл/100 л води 20-25 гр +ПАР.	Обприскування восени від фази сім'ядоль до фази 8 листків культури, або навесні — до фази подовження стебла у культури включно, на ранніх стадіях розвитку бур'янів	1
*Ярий ріпак			Обприскування у фазі до 8 листків культури	
*Соняшник			Обприскування у фазі від 2-до 8 листків культури.	

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Обприскування рекомендовано проводити під час активної вегетації бур'янів: для однорічних дводольних видів — фаза сім'ядоль-2-4 листків. Не рекомендовано застосування коли бур'яни перебувають у стресовому стані (перепади денних і нічних температур, тривала повітряна і ґрунтова посуха), оскільки при уповільненому метаболізмі знижується швидкість переміщення діючих речовин.

СУМІСНІСТЬ

Сумісний з більшістю пестицидів та агрохімікатів. Перед приготуванням робочих сумішей доцільно перевірити препарати на сумісність (відсутність осаду, піни, розшарування, збивання в грудки, неповне розчинення одного з препаратів тощо)



Циркус

Післясходовий протизлаковий гербіцид для широкого спектру польових культур

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Діюча речовина	Клетодим, 360 г/л
 Преперативна форма	Концентрат, що емульгується
 Хімічна група	Циклогександіони
 Класифікація ВООЗ	III-й клас небезпечності
 Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Швидке проникнення в злакові бур'яни.
- ☒ Висока стійкість до змивання опадами.
- ☒ Швидкий візуальний ефект дії продукту. Знищення як наземної, так і підземної частини злакових бур'янів.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробок
Соняшник	Однорічні злакові бур'яни	0,3	Обприскування у фазі 2-4 листків у однорічних бур'янів	1
Соняшник	Багаторічні злакові бур'яни	0,6	Обприскування за висоти 10-15 см у пірія повзучого	
*Соя, *ріпак, *буряки цукрові	Однорічні злакові бур'яни	0,3	Обприскування у фазі 2-4 листків у однорічних бур'янів	
*Соя, *ріпак, *буряки цукрові	Багаторічні злакові бур'яни	0,6	Обприскування за висоти 10-15 см у пірія повзучого	

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Циркус вже містить у своєму складі високоефективні ад'юванти для покращення утримання робочого розчину та прискорення проникнення діючої речовини всередину бур'янів, тому додавання будь-яких інших ад'ювантів не потрібно. Обробку доцільно проводити у ранкові години при температурі від +10 до 25°C.

Рекомендуємо відтермінувати обробку у випадку зниження середньодобової температури нижче +5 °C, а також у випадку заморозків, що відбулися за 3-4 дні до обробки та при загрозі заморозків протягом найближчих 2-х днів після обробки. У разі застосування максимальних норм витрати для контролю багаторічних злакових бур'янів, фаза розвитку соняшнику повинна бути більше 2-х справжніх листків.



Атаракс

Трьохкомпонентний системний фунгіцид з тривалим періодом захисту

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Діюча речовина	Тебуконазол 240 г/л + епоксиконазол 60 г/л + пропіконазол 60 г/л
 Преперативна форма	Концентрат, що емульгується
 Хімічна група	Триазоли
 Класифікація ВООЗ	III-й клас небезпечності
 Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Рістрегулюючі властивості.
- ☒ Високоєфективний контроль найбільш небезпечних хвороб.
- ☒ Довготривала профілактична, лікувальна та викорінююча дії (захисний ефект до 4 тижнів)

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробок
Озима пшениця	Іржа, септоріоз, фузаріоз, борошниста роса, піренофороз	0,8 - 1,0	Обприскування посівів в період вегетації культури	2
*Ріпак озимий	Фомоз альтернаріоз, септоріоз, борошниста роса	0,5 - 0,8		

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Обприскування проводять в період вегетації культур профілактично та за перших ознак прояву хвороб. Оптимальна температура застосування +12...+25 °C (нижній поріг + 10°C), вологість повітря – 65-70%, швидкість вітру - не більше 5 м/с у ранкові або вечірні години.

СУМІСНІСТЬ

Сумісний з більшістю пестицидів та агрохімікатів. Перед приготуванням робочих сумішей доцільно перевірити препарати на сумісність (відсутність осаду, піни, розшарування, збивання в грудки, неповне розчинення одного з препаратів тощо).



Галеріда

Універсальний системний фунгіцид

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Діюча речовина	Карбендазим, 500 г/л
 Преперативна форма	Концентрат суспензії
 Хімічна група	Бензимидазоли
 Класифікація ВООЗ	III-й клас небезпечності
 Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Застосовується при вирощуванні багатьох культур в різних кліматичних зонах.
- ☒ Ефективний проти широкого спектру збудників, має відмінний “стоп-ефект”.
- ☒ Препарат можна змішувати з комплексом мікродобрив та іншими пестицидами.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати, л/га	Період застосування препарату	Кратність обробок
Соняшник	Біла гниль, борошниста роса, сіра гниль, фомоз	0,5 - 1,0	Обприскування в період вегетації	2
Ячмінь озимий та ярий	Борошниста роса	0,3 - 0,5		
Цукровий буряк	Борошниста роса, церкоспороз	0,3 - 0,5		
*Пшениця озима та яра	Борошниста роса	0,3 - 0,5		
*Ріпак озимий та ярий	Біла гниль (склеротиніоз), борошниста роса, сіра гниль, фомоз (плямистість чорна)	0,3 - 1		
*Соя	Септоріоз, аскохітоз	0,5		
*Жито	Борошниста роса, септоріоз (біла плямистість листя), септоріоз колоса	0,3 - 0,5		



Петрітіс

Системний фунгіцид лікувальної та захисної дії для боротьби з широким спектром збудників хвороб культурних рослин.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	Флутріяфол, 250 г/л
Преперативна форма	Концентрат суспензії
Хімічна група	Триазоли
Класифікація ВООЗ	III-й клас небезпечності
Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Має тривалу захисну дію та надійно захищає молодий приріст.
- ☒ Дуже мобільний в рослині.
- ☒ Діє при низьких температурах.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати, л/га	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробок
Пшениця озима та яра	Борошниста роса, бура іржа, септоріоз	0,4 - 0,5	Обприскування в період вегетації	2
*Ячмінь ярий та озимий	Септоріоз, борошниста роса, ринхоспоріоз, смугаста та сітчаста плямистості	0,3 - 0,5		
*Соя	Борошниста роса, антракноз, іржа, церкоспороз, септоріоз	0,4 - 0,5		
*Жито	Борошниста роса, іржасті хвороби	0,3 - 0,5		
*Буряки цукрові	Борошниста роса, церкоспороз	0,25 - 0,5		
*Яблуна	Борошниста роса	0,1 - 0,15		
*Соняшник	Альтернатіоз (рання суха плямистість), іржа, плямистість темно-бура (фомопсис), фомоз (плямистість чорна)	0,4 - 0,5		



Пропізол Форте

Системний фунгіцид для захисту зернових від комплексу грибних хвороб.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Діюча речовина	Пропіконазол, 250 г/л
 Преперативна форма	Концентрат емульсії
 Хімічна група	Триазоли
 Класифікація ВООЗ	III-й клас небезпечності
 Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Надійність контролювання найнебезпечніших захворювань листків і стебел зернових культур
- ☒ Препарат системної дії
- ☒ Висока тривалість дії — більше 25 днів
- ☒ Захист прапорцевого листка від хвороб при одній обробці

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, л/т	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробки
Пшениця озима	Борошниста роса, бура іржа, стеблова іржа, жовта плямистість, септоріоз, борошниста роса, іржа	0,5	Обприскування в період вегетації	2
Ячмінь ярий	Темно-бура плямистість, борошниста роса, іржа	0,5		2
*Буряки цукрові	Борошниста роса, церкоспороз	0,4 – 0,6		2
*Соя	Борошниста роса, іржа, антракноз	0,75		2
*Ріпак	Альтернاریоз	0,5		2

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Обробіток рослин проти захворювань листового апарату і колоса потрібно починати при граничному рівні розвитку хвороби. Максимальна ефективність досягається при профілактичному застосуванні препарату або на ранніх стадіях розвитку захворювання. Препарат проявляє однаково високу ефективність, як при високій, так і при низькій відносній вологості повітря. Підвищені температури повітря в період застосування фунгіциду підсилюють його ефективність. Проводити обробіток в безвітряну погоду, або при швидкості вітру 4 м/с дрібнокрапельне обприскування та 5 м/с крупнокрапельне, вранці або ввечері. Температура повинна перевищувати +15°C.

СУМІСНІСТЬ

Сумісний із більшістю засобів захисту рослин. При використанні бакових сумішей пестицидів слід попередньо провести пробне випробування на сумісність.



Сункар

Комбінований фунгіцид широкого спектру дії

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	Ципроконазол, 80 г/л + Азоксистробін, 200 г/л
Преперативна форма	Концентрат суспензії
Хімічна група	Триазоли, стробілурини
Класифікація ВООЗ	II-й клас небезпечності
Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Превентивна лікувальна дія проти широкого спектра хвороб.
- ☒ Забезпечує подовження вегетації рослини, та володіє «грін ефектом» що збільшує врожайність культури.
- ☒ Відмінна фотостабільність і тривалий період захисту.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати, л/га	Період застосування препарату	Кр-ність обробок
Пшениця озима	Борошниста роса, бура іржа, жовта плямистість	0,5 - 0,75	Обприскування в період вегетації	2
*Кукурудза	Гельмінтоспоріозна й інші плямистості листя, іржа, фузаріоз			
*Соняшник	Альтернаріоз (рання суха плямистість), борошниста роса, пероноспороз (профілактично), іржа, плямистість темно-бура (фомосис), септоріоз (біла плямистість листя), фомоз (плямистість чорна)	0,75 - 1,0		1 - 2
*Ріпак озимий	Альтернаріоз, біла гниль (склеротиніоз), пероноспороз (профілактично), сіра гниль, фомоз (плямистість чорна)	0,5 - 0,75		2
*Ріпак ярий				
*Соя	Борошниста роса, антракноз, іржа, церкоспороз, септоріоз, пероноспороз (профілактично)			
*Ячмінь ярий	Борошниста роса, плямистість облямівкова (ринхоспоріоз), плямистість січasta, плямистість смугаста, плямистість темно-бура септоріоз колоса			



Турнікс

Високоєфективний фунгіцид системної дії

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	Тебуконазол, 250 г/л
Преперативна форма	Емульсія, олія у воді
Хімічна група	Триазолі
Класифікація ВООЗ	III-й клас небезпечності
Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Характеризується тривалим захисним періодом.
- ☒ Виражена рістрегулююча дія. Найактивніший в групі триазолів.
- ☒ Ефективна формуляція для контролю фузаріозу колосу.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробок
Пшениця озима	Фузаріоз колосу, септоріоз та інші плямистості	0,8 - 1,0	В період вегетації	2
*Озимий ріпак	Альтернاریоз, циліндроспоріоз, фомоз, інгібування росту листя та підвищення стійкості до екстремальних погодних умов	0,5 - 1,0		
*Соя	Борошниста роса, антракноз, іржа, церкоспороз, септоріоз			
*Соняшник	Фомоз, септоріоз, альтернاریоз	0,6 - 1,0		

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Як рістрегулятор вноситься в осінній та весняний період на ріпаку, починаючи з фази 3-х листків. Як фунгіцид вноситься в період вегетації культурних рослин профілактично, коли умови сприяють розвитку та поширенню захворювань, або при появі перших візуальних ознак захворювання.

СУМІСНІСТЬ

Продукт сумісний з іншими препаратами. Але в будь-якому випадку перед застосуванням рекомендується провести попередній тест на змішуваність.



Турнікс Екстра

Нова формуляція для покращеного захисту!

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	Тебуканазол 430 г/л
Преперативна форма	Концентрат суспензії
Хімічна група	Триазоли
Класифікація ВООЗ	III-й клас небезпечності
Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Добре виражений «стоп-ефект».
- ☒ Володіє захисною, викорінюючою та лікувальною діями.
- ☒ Відмінний контроль фузаріозу колосу. Проявляє ріст-регулюючу дію на ріпак.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробок
Зернові та колосові культури	Борошниста роса, септоріоз, іржа, піренофороз, фузаріоз колоса	0,3-0,6	Обприскування в період вегетації	1
*Ріпак озимий	Альтернاریоз, циліндроспоріоз, фомоз, інгібування росту листя та підвищення стійкості до екстремальних погодних умов	0,3 - 0,6		
*Соя	Борошниста роса, антракноз, іржа, церкоспороз, септоріоз	0,3 - 0,6		
*Соняшник	Фомоз, септоріоз, альтернاریоз	0,4 - 0,6		

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Застосування Турнікс Екстра на ріпаку озимому в осінній період з нормою 0,09-0,1 л/га препарату на кожен листок стимулює розвиток кореневої системи, посилює накопичення цукрів, а також стримує розвиток хвороб. У фазу 6 листків і більше застосовують з нормою витрати 0,6 л/га.

Період захисної дії препарату залежить від ступеня ураження культур, виду хвороб та погодних умов. Для контролю фузаріозу колосу використовувати максимальну норму 0,6 л/га у фазу цвітіння озимої пшениці. Максимальна ефективність досягається за умови своєчасного застосування фунгіциду з урахуванням даних прогнозів і перших ознак появи захворювань.



Хеліан форте

Локально-системний фунгіцид захисної і лікувальної дії для застосування на основних сільськогосподарських культурах з метою захисту від комплексу хвороб рослин.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Діюча речовина	Піраклостробін 200г/л + боскалід 150 г/л
 Преперативна форма	Концентрат суспензії
 Хімічна група	Стробілурини, піридинкарбоксаміди
 Класифікація ВООЗ	III клас небезпечності
 Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Підходить для застосування на широкому переліку с/г культур, що робить його універсальним у використанні
- ☒ Забезпечує надійний захист від широкого спектра хвороб, включаючи склеротиніоз

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, л/т	Період застосування препарату	Строк останньої обробки до збирання врожаю	Максимальна кратність обробки
Соняшник	Склеротиніоз, фомоз	0,7	Обробка насіння перед висівом	35	2
Ріпак	Склеротиніоз, фомоз	0,7		35	2
*Соя	пероноспоро, септоріоз, антракноз	0,5-0,7		40	2
*Кукурудза	фузаріоз, іржа, гельмінтоспоріоз	0,5-0,7		30	1
*Цукрові буряки	борошниста роса, церкоспороз, пероноспоро	0,5-0,7		30	1

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Обробку слід проводити профілактично або при перших ознаках хвороб, не чекаючи масового розвитку інфекції. Оптимальна температура для внесення: +12...+25°C, при цьому варто уникати внесення під час спеки або сильних рос. Критично важливо забезпечити рівномірне покриття листової поверхні для максимального ефекту. Потрібно уникати обробки перед опадами, а також під час інтенсивного сонячного випромінювання. Не рекомендується використовувати препарат на стресованих культурах (внаслідок посухи, шкідників або гербіцидного навантаження).

СУМІСНІСТЬ

Сумісний з більшістю препаратів. Однак в кожному окремому випадку необхідно попередньо перевірити препарати на сумісність.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не перевищувати рекомендовану норму витрати, це може призвести до стресу у культурі.




Бурунг

Комбінований інсектицид широкого спектру дії для знищення комплексу відкрито- та прихованоживучих сисних і гризучих шкідників та обмеження розвитку рослиноїдних кліщів

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Діюча речовина	Хлорпірифос, 500 г/л + Циперметрин, 50 г/л
 Преперативна форма	Концентрат емульсії
 Хімічна група	Фосфорорганічні сполуки, синтетичні піретроїди
 Класифікація ВООЗ	II-й клас небезпечності
 Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Поєднання контактного, трансламінарного та фумігантного механізму робить Бурунг універсальним засобом.
- ☒ Володіє акарицидними властивостями. Тривалий захисний ефект.
- ☒ Надзвичайно широкий спектр дії.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати, л/га	Період застосування	К-ність обробок
Пшениця озима	П'явиці, злакові попелиці, хлібна жужелиця, озима совка	0,75-1,5	Обприскування в період вегетації	2
Буряки цукрові	Довгоносики, попелиці, щитоноски	0,75-1,0		2
*Соняшник	Бавовникова совка, соняшникова шипоноська, соняшникова вогнівка, попелиці	0,6-1,5		2
*Ячмінь	П'явиці, злакові попелиці, хлібна жужелиця	0,6-1,5		1
*Ріпак	Приховано-хоботник, хрестоцвітні блішки, капустяна попелиця, ріпаковий пильщик, совка озима	0,6-1,5		2
*Соя	Трипси, попелиці, соєва плодоярка, совки, акацієва вогнівка	0,6 - 1,0		1
*Кукурудза	Стебловий кукурудзяний і лучний метелик, бавовникова совка, озима совка	0,75 - 1,5		2
*Горох	Горохова зернівка та плодоярка, попелиці	0,6-1,5		1
*Яблуня	Плодоярки, листовійки, міль, кліщі, попелиці, щитівки	1,0-1,5		2



Корагупс

Інсектицид контактно-кишкової дії. Ефективне поєднання нокаут-ефекту та тривалого періоду захисної дії проти широкого спектру шкідників.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Діюча речовина	Тіаметоксам 200 г/л + Лямбда-цигалотрин 106 г/л
 Преперативна форма	Концентрат суспензії
 Хімічна група	Неонікотиноїди, піретроїди
 Класифікація ВООЗ	II-й клас небезпечності
 Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Поєднання потужного нокдаун-ефекту з тривалим періодом захисту рослини зсередини.
- ☒ Ефективний проти широкого спектру шкідників, у тому числі хлібного туруна і прихованоживучих, незалежно від погодних умов.
- ☒ Дві діючих речовини з різними механізмами дії зменшують ризик появи резистентності.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати, л/га	Період застосування препарату	Кр-ність обробок
Пшениця озима	мухи злакові, цикадки, п'явиці, попелиці, трипси, клоп шкідлива черепашка	0,15-0,2	Обприскування в період вегетації	1
Соняшник	Клопи, попелиця, тютюновий трипс	0,15-0,2		2
*Соя	Трипси, попелиці, чортополохівка	0,15-0,2		
* Цукровий буряк	довгоносики, щитоноска бурякова, попелиця, бурякова муха	0,15-0,2		
*Горох	горохова попелиця, горохова зернівка	0,15-0,2		1
*Ячмінь ярий	мухи злакові, цикадки, п'явиці, попелиці, блішки, трипси, цикадки.	0,15-0,2		
*Ячмінь озимий	попелиці, клопи, п'явиці, блішки, трипси, кузька.	0,15-0,2		2
*Кукурудза	Попелиці, блішки, західний кукурудзяний жук (імаго)	0,15-0,2		
*Ріпак озимий	Ріпаківий квіткоїд, прихованохоботники, попелиці, ріпаківий трач	0,15-0,2		




Ларус

Високоєфективний контактний-шлунковий інсектицид

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	Альфа-циперметрин, 100 г/л
Преперативна форма	Концентрат емульсії
Хімічна група	Синтетичні піретроїди
Класифікація ВООЗ	II-й клас небезпечності
Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Миттєва дія на шкідники, нокаут ефект. Ефективний на всіх стадіях розвитку комах.
- ☒ Нефітотоксичний при застосуванні в рекомендованих дозах.
- ☒ Застосовується в малих дозах, що практично виключає можливий негативний екологічний ефект.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати, л/га	Період застосування препарату	Кратність обробок
Пшениця озима	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, цикадки, злакові попелиці, трипси	0,1-0,15	В період вегетації	2
Капуста	Білянки, капустяна совка, капустяна міль	0,1-0,15		
*Ріпак	Ріпаківий квіткоїд, приховано-хоботник, хрестоцвітні блішки, капустяна попелиця, ріпаківий пильщик	0,1-0,15		
*Соя	Трипси, попелиці, соєва плодояжерка	0,1 - 0,3		
*Буряки цукрові	Звичайний буряковий довгоносик, попелиці, лучний метелик, блішки	0,1-0,25		
*Горох	Горохова плодояжерка, трипси, попелиці	0,15-0,25		
*Картопля	Колорадський жук	0,07-0,10		
*Яблуна	Плодожерки, листовійки	0,15-0,25		



Пандіон

Комбінований високоефективний інсектицид широкого спектру дії

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Діюча речовина	Лямбда-цигалотрин 100 г/л + Імідаклоприд 300 г/л
 Преперативна форма	Концентрат суспензії
 Хімічна група	Комбінована (неонікотиноїди + синтетичні піретроїди)
 Класифікація ВООЗ	II-й клас небезпечності
 Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Швидке Сумарний ефект швидкості дії («нокдаун-ефект») із захисним періодом протягом 14-25 днів. в злакові бур'яни.
- ☒ Пандіон ефективний для знищення шкідників, які ведуть прихований спосіб життя та харчуються на нижній стороні листя.
- ☒ Надійно захищає рослини в умовах високої температури і тривалої сонячної інсоляції.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати, л/га	Період застосування препарату	Кратність обробок
Кукурудза	Комплекс шкідників	0,1 - 0,2	В період вегетації	2
Озима пшениця	Злакові мухи, попелиця, цикадки, трипси, клоп шкідлива черепашка, п'явиці			
*Соя	Трипси, попелиці, чортополохівка			
*Ячмінь	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, хлібні блішки, злакові мухи			
*Соняшник	Клопи, попелиці, тютюновий трипс			
*Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, приховано-хоботник, хрестоцвітні блішки, капустяна попелиця, ріпаковий пильщик			

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною



Вайрос Старт

Фунгіцидний протруйник захисної та лікувальної дії для застосування на зернобобових та інших культурах з метою захисту від комплексу хвороб рослин

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Діюча речовина	Флудіоксоніл, 25 г/л + металаксил - М 10 г/л
 Преперативна форма	Концентрат, який тече, для обробки насіння
 Хімічна група	Фенілпіроли, феніламіди
 Класифікація ВООЗ	III клас небезпечності
 Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Забезпечує глибокий захист – як зовнішньої оболонки насіння, так і його внутрішніх тканин.
- ☒ Оброблене насіння зберігає захисні властивості до 3 років — без втрати ефективності.
- ☒ Підходить для використання на будь-яких сучасних машинах для безперервної протруйки насіння.

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, л/т	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробки
Соя	Пліснявіння насіння, фузаріозна коренева гниль, пероноспороз, аскохітоз	1,0	Обробка насіння перед висівом	1
Горох	Пліснявіння насіння, фузаріозна коренева гниль, пероноспороз, аскохітоз	1,0	Обробка насіння перед висівом	1
*Буряки цукрові	Коренеїд, пліснявіння насіння	9 мл на п.о	Обробка насіння перед висівом	1
*Кукурудза	Стеблові й кореневі гнилі, пліснявіння насіння	1,0	Обробка насіння перед висівом	1
*Ріпак	Пліснявіння насіння, фузаріозна коренева гниль, пероноспороз, альтернаріоз, пітіум	5,0	Обробка насіння перед висівом	1

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Протруйник вноситься безпосередньо перед висівом. Перед застосуванням насіння має бути очищене та відкаліброване. Найкраще підходить для вологих та прохолодних кліматичних умов, де поширені грибкові хвороби на старті вегетації. Підходить для використання в системі інтенсивного захисту культур. Препарат готовий до застосування, не потребує додаткового розведення (залежно від типу протруйальної машини).

СУМІСНІСТЬ

Сумісний із більшістю сучасних фунгіцидних і інсектицидних протруйників, але в кожному конкретному випадку рекомендується попередньо провести тест на сумісність.

Не змішувати з препаратами на основі міді, сірки або сильно лужними сполуками.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Працювати з препаратом у захисних рукавичках та респіраторі.

Уникати контакту з шкірою, очима, не вдихати пару.

Протруєне насіння не використовувати в харчових або кормових цілях. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від +5 до +25°C.



Грус

Інсектицидний протруйник для обробки передпосівного матеріалу зернових і овочевих культур

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Діюча речовина	Тіаметоксам, 350 г/л
 Преперативна форма	Концентрат, який тече, для обробки насіння
 Хімічна група	Неонікотиноїди
 Класифікація ВООЗ	II-й клас небезпечності
 Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Системна дія забезпечує ефективний захист від ґрунтових і післясходових шкідників протягом 6–8 тижнів.
- ☒ Збереження оптимальної густоти сходів при мінімальній витраті насіннєвого матеріалу.
- ☒ Відсутність негативної дії на посівні якості насіння (зокрема й того, яке зберігалось протягом року після обробки).

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Період застосування препарату	Максимальна кратність обробок
Соняшник	Дротяники	6,0 – 10,0	Обробка насіння перед висіванням	1
*Кукурудза	Дротяники, попелиці, блішки	6,0-9,0 (144 мл на 80 тис нас.)		
*Картопля	Колорадський жук, комплекс ґрунтових і посходових шкідників	0,3		
*Буряки цукрові	Довгоносики, блішки, щитоніжки, піщаний мідяк, бурякова крихітка, попелиці	10,0-15,0		
*Ріпак	Хрестоцвіті і ріпакова блішки, ріпаковий пильщик, попелиці, дротяники, несправжні дротяники	4,0		
*Льон	Льонова блішка	0,5		
*Сорго	Попелиці	5,0		
*Пшениця озима	Хлібна жужелиця, злакові мухи, цикадки, попелиці	0,4-0,5		




Тетрао

Високоєфективний інсектицидний протруйник

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	Імідаклоприд, 600 г/л
Преперативна форма	Текучий концентрат суспензії
Хімічна група	Неонікотиніди
Класифікація ВООЗ	II-й клас небезпечності
Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ✓ Висока системність препарату забезпечує його надійне проникнення в органи рослин та довготривалий захист кореневої системи і проростків.
- ✓ Володіє відмінними фізико-хімічними властивостями, що дозволяє препарату добре утримуватися на обробленій поверхні тривалий час.
- ✓ Не проявляє фітотоксичності в рекомендованих нормах. Сумісний з більшістю фунгіцидних протруйників.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

Культура	Цільовий об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Період застосування препарату	Макс. кратність обробок
Соняшник	Дротяники, попелиці	5,0-9,0	Обробка насіння суспензією препарату перед висіванням	1
Кукурудза	Дротяники, попелиці, блішки	5,0-7,0		
*Пшениця озима	Попелиці, цикади, хлібна жужелиця	0,3-1,6		
*Ячмінь ярий	Злакові мухи, попелиці, цикадки, підгризаючі совки, хлібна жужелиця	0,3-0,85		
*Соя	Комплекс ґрунтових шкідників	0,3-0,5		

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Тетрао використовується для обробки насіння. Робочий розчин потрібно використати протягом доби. Слід використовувати насіння очищене від пилу. Завдяки вдалій формуляції досягається рівномірне покриття насіння. Тетрао забезпечує контроль шкідників впродовж тривалого періоду. Вдалий вибір для боротьби з ґрунтовими шкідниками.

СУМІСНІСТЬ

Тетрао сумісний з більшістю фунгіцидних протруйників, але в кожному конкретному випадку доцільно перевірити їх на сумісність (відсутність осаду, піни, розшарування, збивання в грудки, неповне розчинення одного з препаратів, тощо).



Мілвус

Швидкий неселективний контактний десикант

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Діюча речовина	Дикват, 150 г/л
 Преперативна форма	Розчинний концентрат
 Хімічна група	Похідні арилоксифеноксипропіонової кислоти
 Класифікація ВООЗ	II-й клас небезпечності
 Тара	Каністра 20 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Дозволяє приступити до збирання врожаю вже через 6–10 днів після обприскування.
- ☒ Полегшує збирання, оскільки разом з культурними висушує бур'яни.
- ☒ Сприяє припиненню розповсюдження хвороб, наприклад: фітофторозу, білої та сірої гнилей.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

Культура	Норма витрати, л/га	Період застосування препарату	К-ність обробок
*Соняшник	2,0-3,0	Обприскування посівів у фазі побуріння кошиків	1
*Зернові	2,0-3,0	За 2 тижні до збирання за умови вологості зерна не більше 30%	
*Соя	2,0-3,0	У фазі початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів, за вологості зерна не більше 35-40%	
*Ріпак	2,5-3,0	При побурінні 70% стручків культури	
*Льон	2,0 - 3,0	У фазі ранньої жовтої стиглості культури	
*Картопля	1,5 - 2,0	За 10 днів до збирання культури	
*Сорго	4,0	У період воскової стиглості насіння, за вологості зерна не більше 25%	

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Мілвус володіє дуже швидкою дією. Препарат діє швидше в умовах теплої сонячної погоди, але внесення при цьому має бути за прохолодної та хмарної погоди. Верхня межа температури при проведенні десикації не повинна перевищувати +25°C.

Для досягнення найкращого результату необхідно забезпечити повне покриття рослин робочим розчином. Обприскувач повинен бути правильно відкаліброваним. Слід використовувати чисту або відфільтровану воду, адже брудна вода знижує ефективність препарату.



Мілвус Екстра

Універсальний десикант контактної дії для наземного та авіаційного способу внесення.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	Дикват дибромід 374 г/л
Преперативна форма	Розчинний концентрат
Хімічна група	Похідні біпіридилію
Класифікація ВООЗ	II-й клас небезпечності
Тара	Каністра 20 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Прискорює технологічну стиглість рослин та зменшує втрати при збиранні.
- ☒ Надзвичайно швидка дія.
- ☒ Низька норма застосування.

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

* Практика використання препаратів з ідентичною діючою речовиною

Культура	Норма витрати, л/га	Період застосування препарату	К-ність обробок
Соняшник	0,8 - 1,2	Десикація у фазі початку побуріння кошиків (в т.ч. авіаметодом)	1
*Ріпак		Десикація при побурінні 70% стручків (в т.ч. авіаметодом)	
*Соя		Десикація у фазу побуріння бобів нижнього і середнього ярусів (за вологості не більше 25–30%)	
*Горох		Десикація у період пожовтіння стручків, за вологості зерна не більше 35%	
*Гречка		6-10 днів до збирання врожаю	
*Картопля		10 днів до збирання врожаю	
*Зернові колосові		6-10 днів до збирання врожаю	

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Збільшення норми вливу робочого розчину покращує дію десиканту. Температура застосування до +25°C. Обробку рекомендується проводити в похмуру погоду або вночі. Робочий розчин готується безпосередньо перед внесенням та використовується протягом доби.

Під час внесення робоча швидкість агрегату повинна становити 7-10 км/год. Забороняється проводити обприскування при швидкості вітру більше ніж 3-4 м/с. Для підвищення ефективності додайте Стрікс у нормі 0,2-0,3 л/га на 250-300 л води.



Аквакор

Високоєфективний рН-коректор для підкислення робочого розчину та нейтралізації негативного впливу іонів жорсткої води.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Діюча речовина	Суміш органічних кислот, хелатуючі агенти
 Преперативна форма	Водорозчинний концентрат
 Хімічна група	Органічні кислоти та хелатуючі агенти (комплексоутворювачі)
 Класифікація ВООЗ	IV клас (мало токсичні)
 Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Запобігає лужному гідролізу чутливих ЗЗР
- ☒ Нейтралізує іони жорсткості (Ca^{2+} , Mg^{2+})
- ☒ 100% розчинність, без осаду
- ☒ Покращує стабільність і гомогенність складних бакових сумішей

РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ

рН води	Норма рН-коректора, мл на 100 л бакового розчину				
	20 мл	40 мл	60 мл	80 мл	100 мл
7,48	6,67+/-0,25	5,92+/-0,25	5,15+/-0,25	4,63+/-0,25	4,30+/-0,25

Норму потрібно встановити індивідуально для кожного джерела відбору води. При визначенні рН необхідно використовувати рН-метр або лакмусовий папірець. Норма препарату залежить від якісних показників води, а також бажаного рівня контролю за показником рН розчину та рекомендації виробників препаратів, що використовуються в баковій суміші. Зазвичай норма знаходиться в межах від 30 до 150 літрів робочого розчину.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

рН-коректор завжди повинен додаватися у воду першим для підготовки води перед розчиненням препаратів та недопущенням початку реакції лужної гідратації.

МЕХАНІЗМ ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ

Бак обприскувача заповнюється водою на одну третину або половину об'єму. Додати розраховану кількість рН-коректора в бак обприскувача. Перемішати воду. Додавайте засоби захисту рослин.

СУМІСНІСТЬ

Сумісний з усіма пестицидами та макро-мікроелементами. Не рекомендується використовувати з препаратами, які містять мідь та вапно.



Віраго

Високоєфективний концентрований піногасник для робочих розчинів пестицидів.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	Полідиметилсилоксан
Преперативна форма	Емульсія
Хімічна група	Органосиліконові сполуки
Класифікація ВООЗ	IV клас (мало токсичні)
Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Миттєво знищує піну
- ☒ Заощаджує час при приготуванні сумішей
- ☒ Економна витрата препарату

НОРМА ЗАСТОСУВАННЯ

Норма внесення піногасника залежить від бажаного ступеня контролю за піноутворенням і зазвичай лежить в межах від 4-10 мл на 100 л робочого розчину. В окремих випадках, залежно від агресивності піноутворюючих агентів, рівня інтенсивності процесу змішування, структури та щільності піни, норму витрати препарату допустимо збільшувати до 50 мл на 100 л води. Якщо піногасник додають під час інтенсивного процесу піноутворення необхідно вводити його в розбавленому вигляді. Це підвищує ефективність піногасіння. Розведення проводять холодною водою у співвідношенні 1:10. Якщо при подачі піногасника використовують живильні насоси, то вони повинні забезпечувати низьке зусилля зсуву.

МЕХАНІЗМ ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ

Бак обприскувача заповнюється водою на одну третину або половину об'єму. Необхідну кількість препарату потрібно розчинити у воді з розрахунку (1:10). Додати розчинений у воді піногасник в бак обприскувача. Починайте перемішування, після чого додавайте пестициди. Якщо піна в робочому розчині вже утворилася: розпилюйте розчинений піногасник у воді (1:10), на поверхню піни до тих пір, поки вона не спаде, розрахункова норма препарату має при цьому бути дещо збільшена. Увага! Піногасник повинен завжди додаватися у воду, а не вода у піногасник!

СУМІСНІСТЬ

Сумісний з усіма пестицидами та агрохімікатами.



Каліго

Допоміжний засіб для зменшення поверхневого натягу рідини та кращого змочування гідрофобних поверхонь для підвищення ефективності та прискорення дії засобів захисту рослин.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Діюча речовина	Етоксилат ізодецилового спирту, 100%
 Преперативна форма	Рідина
 Хімічна група	ПАР
 Класифікація ВООЗ	III клас (помірно токсичні)
 Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Ефективно знижує поверхневий натяг робочої рідини.
- ☒ Збільшує швидкість проникнення діючої речовини через кутикулу рослини.
- ☒ Посилює дію гербіцидів, даючи змогу знизити їх норми використання.

НОРМА ВИКОРИСТАННЯ

Препарат застосовується в бакових сумішах з пестицидами при обробці сільськогосподарських культур за регламентами використання в концентрації від 0,075 - 0,15 л / 100 л робочого розчину. Норма витрати та концентрація робочого розчину встановлюється в залежності від виду культури, локалізації шкідливого об'єкту (бур'яни, шкідники, хвороби), площі листка, стеблової маси та дисперсності розпилення. Концентрація препарату в робочій рідині повинна становити 0,075 – 0,15 %.

МЕХАНІЗМ ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ

Бак оприскувача заповнюється водою на одну третину або половину об'єму, при включеному режимі змішування додавши необхідну розрахункову кількість пестициду, потім мішалку зупинити і додати необхідний об'єм препарату. Після цього долити воду до повного об'єму резервуару оприскувача та знову включити режим змішування. Оприскування с/г культур бажано проводити при температурі повітря не вище 25°C, за швидкості вітру не вище 3 м/с при дрібнокрапельному і 5 м/с при великокрапельному оприскуванні.

СУМІСНІСТЬ

Препарат сумісний практично зі всіма засобами захисту рослин (окрім якщо вони не потребують свого суто специфічного ПАР). Перед змішуванням потрібно перевірити сумісність препаратів. Приготовлений робочий розчин не повинен давати осад, допускається незначне помутніння.

УВАГА!

Не рекомендується виконувати обробку в умовах дії низьких або високих температур повітря, інтенсивного сонячного випромінювання та сильного вітру, або перед очікуваними опадами.



Стрікс

Багатофункціональний ад'ювант для підвищення ефективності використання засобів захисту рослин та мікродобрив

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діюча речовина	Органосиліконовий сурфактант
Преперативна форма	Розчинний концентрат
Хімічна група	Органосилікони
Класифікація ВООЗ	Безпечний
Тара	Каністра 5 л

ДЕТАЛІ НА САЙТІ



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

- ☒ Суттєво зменшує поверхневий натяг робочого розчину.
- ☒ Покращує проникнення засобів захисту рослин через воскову поверхню листя.
- ☒ Покращує стійкість робочого розчину до опадів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Заповнити одну третину баку обприскувача водою, додати пестицид (мікродобриво), а потім додати необхідну кількість ад'юванту. До кінця заповнити бак обприскувача водою при постійному перемішуванні.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Стрікс рекомендується застосовувати для підвищення ефективності використання гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів та мікроелементів на польових, плодових та спеціальних культурах. Восковий наліт рослини, покрити шкідників і навіть гриби-патогени мають водовідштовхуючі властивості. Це спричиняє стікання крапель робочого розчину з об'єкту. Стрікс забезпечує краще зчеплення пестициду з об'єктом та зменшує стікання. Препарат, капсульований ад'ювантом, поширюється на листовій поверхні у 8-16 разів більше, ніж якби він знаходився у краплі води аналогічного розміру, а також краще проникає у рослину. Завдяки олійній основі та швидкому прилипанню, Стрікс забезпечує стійкість пестициду до змивання опадами вже за декілька хвилин після обробки, а також захищає пестицид від втрат внаслідок випаровування, розкладу від фотодеградації та летючості.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ


Підвищує проникнення гербіцидів в рослину, що збільшує ризик їх фітотоксичної дії на культуру. Тому безпечне застосування Стрікс можливе тільки з гербіцидами суцільної дії і з перевіреними та зареєстрованими для спільного застосування гербіцидами.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

При обробці насіння сприяє якісному нанесенні препаратів та унеможлиблює їх осипання. Сприяє утриманню вологи навколо насінини, в результаті чого відбувається швидше проникнення вологи у насінину та швидше і дружніше проростання. При застосуванні із ґрунтовими гербіцидами знижує їх негативний вплив на проросток культури за рахунок утримання його у верхніх шарах ґрунту та зменшення промивання. Дозволяє знизити внесення хімічних препаратів до мінімально рекомендованих. Також знизити об'єм розчину на 20 – 35 % та підвищити швидкість обприскувача до 12 – 15 км/год.

СУМІСНІСТЬ

Можливе використання в бакових сумішах.



Бакові суміші ЗЗР

Бакові суміші **62**

Рекомендації до бакових сумішей **63**





Фунгіциди

Соняшник

Галеріда 0,5 - 1,0 л/га + Петрітіс 0,5 л/га

Профілактика білої гнилі, фомозу та фомопсису. Контроль септорії, альтернарії, іржі та борошнистої роси. Рекомендується обробка у фазу 6-10 листків.

Соя

Галеріда 0,5 л/га + Петрітіс 0,5 л/га

Профілактика та контроль основних хвороб. Рекомендується внесення бакової суміші у фазу 1-3 трійчастого листка.

Ріпак

Галеріда 0,5 л/га + Петрітіс 0,5 л/га

Профілактика та контроль основних хвороб. Обробка рекомендується у фазу від 8-10 листків до фази бутонізації.

Галеріда 0,5 л/га + Турнікс 0,6 - 1,0 л/га

Профілактика білої гнилі. Контроль борошнистої роси, альтернаріозу, фомозу та циліндроспоріозу. Ріст регуляція. Обприскування рекомендується у фазу 4-8 листків, а також у фазу розвитку бічних пагонів.

Галеріда 0,5 л/га + Турнікс Екстра 0,4 - 0,6 л/га

Профілактика білої гнилі. Контроль борошнистої роси, альтернаріозу, фомозу і циліндроспоріозу. Ріст регуляція. Внесення бакової суміші рекомендується у фазу 4-8 листків, а також у фазу розвитку бічних пагонів.

Пшениця

Галеріда 0,5 л/га + Петрітіс 0,5 л/га

Профілактика та контроль основних хвороб. Обробка рекомендується у період від фази кушення до виходу з трубки.

Турнікс 1,0 л/га + Петрітіс 0,3 - 0,5 л/га

Забезпечує посилений контроль хвороб колоса. Внесення рекомендується у період з кінця цвітіння до виходу пиляків з колосу.

Турнікс Екстра 0,6 л/га + Петрітіс 0,3-0,5 л/га

Контроль хвороб колоса у період з кінця цвітіння до виходу пиляків з колосу.



Гербіциди

Кукурудза

Батагур АХ 1,0 - 1,25 л/га + Неофрон 0,5 - 0,6 л/га

Контроль як злакових, так і дводольних бур'янів у фазу 3-6 листків культури.

Соя (грунтова)

Метрибузин-Стар 0,4 - 0,6 л/га + Корвус 2,0 - 2,5 л/га + Калхат 0,15 - 0,2 л/га

Контроль всього спектру однорічних злакових та однорічних дводольних бур'янів.

Ріпак (грунтова)

Корвус 2,0 - 3,0 л/га + Калхат 0,15 - 0,2 л/га

Забезпечує посилений контроль однорічних злакових та однорічних дводольних бур'янів.

Соняшник, соя (грунтова)

Корвус 1,5 - 2,5 л/га + Стурнус 1,5 - 2,5 л/га

Забезпечує посилений контроль однорічних злакових та однорічних дводольних бур'янів.

Пшениця

Неофрон 0,4 - 0,5 л/га + Трінга 0,015 - 0,02 кг/га + Стрікс 0,05 - 0,1 л/га

Забезпечує посилений контроль однорічних та багаторічних дводольних бур'янів (в тому числі проблемних, включаючи падалицю соняшника та ріпаку всіх видів) від фази кушення до фази другого міжвузля.



Інсектициди

Цукровий буряк

Бурунг 0,6 - 1,0 л/га + Ларус 0,2 - 0,3 л/га

Забезпечує контроль бурякового довгоносика. Внесення рекомендується за наявності шкідника.

ПОРЯДОК ПРИГОТУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ

Під час приготування бакових сумішей важливо враховувати послідовність додавання ЗЗР, що входять до складу, у бак обприскувача залежно від їх препаративної форми:



1.Коректори РН та жорсткості води.

Для уникнення піноутворення.



2.Водорозчинні пакети.



3.Сухі препаративні форми:

водно-дисперговані гранули (ВДГ), змочувані порошки (ЗП), водорозчинний порошок (ВРП), суха текуча суспензія (СТС), водорозчинні гранули (ВГ).



4.Препаративні форми у вигляді суспензій і паст:

водно-суспензійний концентрат (ВСК), концентрат суспензії (КС), суспензійний концентрат (СК), мікрокапсульована суспензія (МКС), текуча суспензія (ТС), текуча паста (ТПС).



5.Препаративні форми у вигляді емульсій (масляні й водні) та колоїдного розчину:

мікроемульсія (МЕ), концентрат емульсії (КЕ), суспензійна емульсія (СЕ), масляний концентрат емульсії (МКЕ), масляна дисперсія (МД), емульсія масляно-водна (ЕМВ), водна емульсія (ВЕ), концентрат колоїдного розчину (ККР).



5.Препаративні форми у вигляді емульсій (масляні й водні) та колоїдного розчину:

мікроемульсія (МЕ), концентрат емульсії (КЕ), суспензійна емульсія (СЕ), масляний концентрат емульсії (МКЕ), масляна дисперсія (МД), емульсія масляно-водна (ЕМВ), водна емульсія (ВЕ), концентрат колоїдного розчину (ККР).



6.Поверхнево-активні речовини (ПАР).

Після розчинення препаратів із вмістом масла додавання в бакову суміш ПАР дає змогу зберегти властивості робочого розчину. Після додавання ПАР у баковій суміші можна розчиняти препарати, в яких містяться водорозчинні діючі речовини та водорозчинні рідини. ПАР обволікає масло, не дає йому зв'язатися з іншими компонентами бакової суміші, зберігаючи діючі речовини в стані суспензії та оберігаючи від утворення пластівців.




7.Водорозчинні препарати і рідини:

водний розчин (ВР), водний концентрат (ВК), водорозчинний концентрат (ВРК).



8.Рідкі добрива, мікроелементи для листового підживлення та регулятори росту.

Масло, з огляду на його властивості, утворює з частинками діючої речовини не розчинні у воді сполуки. Тому, якщо сухі речовини не повністю розчинилися, добавка речовин із маслом може призвести до розшарування рідин і утворення густого осаду в баку обприскувача.



Системи захисту та живлення рослин

Кукурудза	66
Озима пшениця	67
Ріпак	68
Соняшник	69
Соя	70



[illegible]

Добриво

Прилипач

Фунгіцид

Десикант

Інсектицид

Гербіцид

Протруйник

Протруйник	Гербіцид	Інсектицид	Десикант	Фунгіцид	Прилипач	Добриво
------------	----------	------------	----------	----------	----------	---------

[illegible]

Протруйник

Гербіцид

Інсектицид

Десикант

Фунгіцид

Прилипач

Добриво

[illegible]

Добри

Прилипач

Фунгіцид

Десикант

Інсектицид

Гербіцид

Протруйник

- Протруйник
- Гербіцид
- Інсектицид
- Десикант
- Фунгіцид
- Прилипач
- Добриво

